

Przedpłata :
w eksp. m. 0,75 zł
na pocztę 0,82 zł
kwartal. 2,45 zł
Oređownik
w y c h o d z i
w sobotę.

Oređownik

na pow. Leszczyński

Ogłoszenia :
przyjmuje się
za opłatą 10 gr.
za wiersz mm.
4-lamowy.

Plaga gza bydła rogatego i jej zwalczanie.

W okolicach, gdzie bydło rogате pasie się na pastwiskach bywa ono napastowane przez muchy zwane gżami, czerwie tych much, żyjąc w ciele bydła, wyrządzają tam znaczne szkody, głównie zaś uszkadzają skóry bydłecę, skąd wynikają poważne straty dla rolnictwa, przemysłu rzeźniczego i skórzanego. Pladze tej można zapobiec stosunkowo małym kosztem, jeżeli tylko wszyscy posiadacze stad bydła rogatego zjednoczą się dla wspólnej walki przeciwko gżowi.

Zwalczanie: Jako zupełnie pewny środek przeciw szkodom powodowanym przez gza, należy uważać niszczenie czerwi pod skórą, ponieważ przez ich zniszczenie uniemożliwia się rozwój dalszej generacji gza. Przy wykonywaniu niszczenia należy uwzględnić, co następuje:

1) Właściwym momentem do usunięcia czerwi jest chwila, gdy pasorzyt jeszcze nie osiągnął takiego rozwoju, żeby mógł wydostać się z guzów podskórnych. Wobec tego usuwanie czerwi musi być stosowane w czasie od końca kwietnia w początku maja — przed wypędzeniem bydła na pastwisko. Należy koniecznie zwracać uwagę na to, ażeby bydło rogате przed wypędzeniem z obory na pastwisko było wolne od czerwi gza. U bydła, które przez całe lato pozostaje w oborze, czynić tego nie potrzeba.

2) Usuwanie czerwi wykonywa się w następujący sposób: czerwie, znajdujące się w większych guzach, należy wycisnąć zapomocą palców ująwszy skórę w fałd. Czerwie dorosłe zwłaszcza zaś te, które już rozszerzyły otwór w guzie, dają się w ten sposób usunąć bez trudu, młodzieńców natomiast wyciskać nie można. Ażeby je usunąć należy wprowadzić do otworu guza szpilkę lub szydełko i nakłuć czerwia, które czarno wyglądający odwłok zwykle ukazuje się w otworze guza. Wskutek tego zabiegu wypływa zawartość czerwia. Dopomaga się temu zabiegowi przez silny ucisk guza zapomocą palców. Nakłuwania czerwia należy dokonywać ostrożnie, unikając skaleczenia skó-

ry. Do wydobywania czerwi z guzów można również posługiwać się szydełkiem używanem do robót ręcznych. Wprowadza się je przez otwór do guza na głębokość 1 do 2 cm. w ten sposób, iż haczyk szydełka zwrócony jest do Czerwia, przyczem należy unikać tak uszkodzenia tkanek zwierzęcia, jak i przekłucia czerwia. Następnie podciąga się haczykiem czerwia na tyle, żeby jego tylny koniec wysunął się przez otwór i dał się uchwycić szczypcami o dość szerokich, karbowanych od środka końcach. Sposób ten, stosowany szeroko w Danji i Niemczech, wymaga wprawdzie pewnej wprawy, nabyć ją jednak nie trudno. Wyciśnięte lub wydobyte czerwie należy zniszczyć.

Usuwanie poczwerek gza zapomocą nacięcia guza należy unikać — zabieg ten w razie potrzeby może być wykonany tylko przez lekarza weterynaryjnego. W przypadkach, w których podane wyżej sposoby nie mogą być zastosowane, należy guzy na skórze smarować dziegciem dwukrotnie w odstępie 7 dni, najlepiej po uprzednim wystrzyżeniu włosów.

W czasie wypędzenia bydła na pastwisko należy w pewnych odstępach czasu (najmniej co 14 dni) dokładnie każdą sztukę zbadać, przyczem czerwie rozwijające się stopniowo usuwać w sposób wyżej wskazany. Jeżeli na pastwisku albo w jego pobliżu znajduje się obora lub starowisko dla postoju bydła, wskazane jest przeprowadzanie usuwania czerwi gza w tych miejscach. Zabieg usuwania czerwi z pod skóry może łatwo być wykonany przez właściciela lub służbę.

3. Historia rozwoju gza poucza, że gospodarze, ograniczający się w walce z tym szkodnikiem tylko do swojej obory, nie osiągają pożądaných wyników. Tylko przez łączne energiczne postępowanie wszystkich posiadaczy bydła w dotkniętej okolicy można osiągnąć skuteczne wyniki.

Leszno, dnia 31 maja 1933 r.

Za Starostę Powiatowego
Gummer,

Pow. Lekarz Wet.

Nr. A. 71/33.

